



### UTILISATION

Croquettes alimentaires élaborées pour lutter contre la présence des sangliers en cultures, jardins, pelouses, etc. et tout lieu à protéger contre les dégâts générés par les sangliers.

### METHODE D'APPLICATION / DOSE

**Curatif :** des résultats peuvent être obtenus en formant deux lignes parallèles aux passages des sangliers avec une poignée de croquettes tous les 5 m. Vérifier la consommation tous les jours, réapprovisionner si nécessaire. Lorsque la consommation s'arrête, si opportun, espacer les points d'appâtage (20 - 50 m) pour servir de « témoins » à d'éventuelles infestations nouvelles.

**Préventif :** autour des surfaces à protéger, créer une ligne parsemée d'environ 30 à 50 g de REP'CLAC Sanglier tous les 10 à 20 m. Contrôler la consommation une fois par semaine.

**MODE D'ACTION** Les croquettes attirent les sangliers qui cherchent la nourriture. Après avoir ingéré environ 30-50 g d'appât, le goût désagréable à effet retardé provoquera immédiatement le déplacement définitif de l'animal vers d'autres lieux.

### DESCRIPTIF PRODUIT

**Poivre : 45 g/kg, huile de poisson, céréales broyées sur support végétal.**

détenteur Morpheus 79 Thouars sous N° AMM 2120042. Agrément d'entreprise n° PA00973, distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

Support	Croquettes
Utilisation	Attractif
Cible	Sanglier
Usages	Professionnel
Zones d'utilisation	Cultures, jardins, pelouses...
Référence(s)	RE-ORE-05012: 2kg RE-ORE-05016 : 10kg

**DURÉE D'EFFICACITÉ** • Environ 2 - 3 semaines sur sol humide/mouillé. • 5 - 6 semaines sur terrain sec. • Environ 2 - 3 mois si le produit est protégé (tuiles/planches). L'appât mis ainsi, sera hors de la portée des oiseaux (corbeaux, etc.).

**DURÉE D'ACTION** Si un sanglier absorbe un minimum de 30-50 g de granulés, cela sera suffisant, pour qu'il ne revienne plus sur la parcelle, où il a ingéré l'appât.

**AVANTAGES** • Cet appât agit immédiatement et à faibles doses. Les résultats sont probants si une quantité suffisante de produit a été répandue et est disponible pour tous les sangliers. • On peut réduire la quantité épandue si on traite seulement les endroits de passage des sangliers.

NB : certains aliments consommés par les sangliers peuvent être plus appétants que les croquettes REP'CLAC (ex : maïs, raisins...), il est donc fortement conseillé d'agir en préventif 1 à 2 mois avant la récolte.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Placer de préférence les croquettes à une distance d'au moins 10 m de la source alimentaire.

### CONSERVATION

24 mois après date de fabrication si stocké dans un endroit sec et frais (voir date de péremption sur le sac).