

Protecta

Gardez le meilleur de la nature

TRICO



Diffuseur TRICO
Contenance maxi : 6 cl
Ref. EQ-OEQ-01011

UTILISATION

Répulsif, agent de prévention des dommages causés par les cervidés : protection longue durée contre les dégâts de cerfs et chevreuils en forêt, et les dégâts de chevreuils

NB : ne pas appliquer par temps pluvieux (risque de lessivage).

METHODE D'APPLICATION / DOSE

1/ Pulvérisation du produit pur ou dilué : Appliquer TRICO® sur les jeunes pousses et les parties végétales susceptibles d'être attaquées par les cervidés

Pour d'importantes superficies et en cas de faible pression, l'application de TRICO® en bordure de parcelle sur 5 à 10 m (partie intérieure de la parcelle) peut être suffisante.

2/ Utilisation de diffuseurs : en préventif (dans les cas récurrents préférer la pulvérisation) sur le pourtour des parcelles (1 tous les 8 m plus 1 à chaque entrée de rangée) permet d'utiliser TRICO® sans devoir pulvériser la végétation. Chaque diffuseur contient environ 5 cl de produit (pur non dilué). La durée de diffusion dépendra de la température (de 6 à 8 semaines).

3/ Délai de reentrée sur parcelle : 6h après application.

DESCRIPTIF PRODUIT

Graisse de mouton 64,6 g/l (6,4% m/m) Contient du 5-chloro-2-méthyl-3(2H)-isothiazolone et du 2-méthyl-3(2H)-isothiazolone. AMM : 2120057 KWIZDA Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 WIEN (Autriche). Importé par Solutions et Plants.

Support	Liquide
Utilisation	Répulsif
Cible	Cervidés : cerfs, chevreuils
Usages	Professionnel
Zones d'utilisation	les jeunes pousses et les parties végétales susceptibles d'être attaquées par les cervidés.
Référence(s)	RE-ORE-05019 : Flacon 1L RE-ORE-05021 : Bidon 5 L

Culture	Stade	Dose/Ha	Dilution & précé	Nb d'appli	Intervalle entre appli
Forêts	Toute saison	5 à 10L/ha suivant la plantation	Pur (4 à 8ml/plant)	1	/
Viticulture	2 feuilles jusqu'à floraison	10 L	1 pour 3l d'eau Environ 6 ml/plant, pied à pied	2	4-6 semaines
Maïs, soja, tournesol, colza	3 feuilles jusqu'à floraison	10L	1 pour 15 L d'eau	4	4-6 semaines

UTILISATION SUR VIGNES DE PRODUCTION

Après floraison, utiliser TRICO® dans des diffuseurs uniquement. Une altération de la qualité des produits récoltés pourrait subvenir après une utilisation tardive sur floraison. Durée d'efficacité : jusqu'à 6 mois si utilisé pur (traitement d'hiver) ou bien jusqu'à 1-2 mois suivant dilution, et pression des ravageurs. NB : lors de l'application, éviter que le produit ne se répande sur des parcelles voisines après la période de floraison.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Aucun mélange possible avec une autre spécialité. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Lors de l'utilisation du produit, bien vider et rincer le bidon en versant l'eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur.

CONSERVATION

24 mois si stocké dans un endroit frais.

AEDES
Protecta

ZAC de la plaine 13440 Cabannes
Tél. 04 90 02 16 20 mail: contact@an-protecta.eu Site internet : www.aedes-protecta.fr

L'entreprise Aedes Protecta SAS est agréée sous le n° IF00065 : distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Utiliser les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Utilisable en agriculture biologique.

MAJ 12/12/18